Fisica e astrofisica dei neutrini

Biblioteca Civica Multimediale Archimede
Settimo Torinese, 18 febbraio 2014

Alessandro Bottino

Tutte le particelle che conosciamo sono riconducibili ai seguenti costituenti (quarks e leptoni)

e ai corrispondenti anti-quarks e anti-leptoni:

$$q \rightarrow \bar{q}; \quad e^- \rightarrow e^+, \quad \nu_e \rightarrow \bar{\nu}_e, \dots$$

Neutrini ed interazione debole

decadimento beta di un nucleo

decadimento beta del neutrone

Molti nuclei atomici instabili acquisiscono stabilita' emettendo radiazione beta:

(ossia, all'interno del nucleo: $n \Rightarrow p + e^- + \bar{\nu}_e$)

assieme all'elettrone viene anche emesso un neutrino: particella di carica nulla e massa piccola rispetto a quella dell'elettrone (ipotesi di PAULI 1930)

(ossia all'interno del nucleo: $p \Rightarrow n + e^+ + \nu_e$)

Questi processi sono dovuti **all'interazione debole**

emissione di coppia elettrone-neutrino in analogia con il caso elettromagnetico
FERMI

diseccitazione di un nucleo

decadimento beta di un nucleo

questo sarà il **bosone W** del **modello standard** dell'interazione elettrodebole

teoria dell'interazione debole (1933)

Numeri leptonici

leptoni

L_e	+1	0	0
L_μ	0	+1	0
L_τ	0	0	+1

antileptoni

L_e	-1	0	0
L_μ	0	-1	0
L_τ	0	0	-1

Conservazione dei numeri leptonici (diagrammi di Feynman)

rappresentiamo il **decadimento del neutrone** con il diagramma

schema analogo per **urto di positrone su neutrone**

oppure urto **neutrino-neutrone**

esistono 3 tipi di neutrini di diverso "sapore"

Prima rivelazione di neutrino (Fred Reines e Clyde Cowan, 1957)

antineutrino $\bar{\nu}_e$ generato dal reattore

e rivelato mediante il processo

Neutrini solari

Il sole e' una potente sorgente di neutrini ν_e prodotti in **reazioni di fusione termonucleare**, avviate dal processo debole

con risultato netto finale

I neutrini hanno energia media 1 MeV ed un flusso sulla terra $\approx 6 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2} \text{ sec}^{-1}$

distanza Sole - Terra $\approx 150 \cdot 10^6 \text{ Km}$

esperimento pilota (**Homestake experiment**):
il flusso di neutrini ν_e misurato e' solo un terzo di quello atteso sulla base del modello solare (**deficit dei neutrini solari**) - Kamioka, Gallex, Sage, SNO, Borexino

Raymond Davis Jr
(Nobel 2002)

Neutrini da Supernove

Esplosione di una supernova: in pochi secondi una stella esplode emettendo nello spazio una grande quantità di materia, fotoni e neutrini.

Supernova SN1987: 23 febbraio 1987 - nella Grande Nube di Magellano ad una distanza di $51,8 \text{ Kpc} = 1,61 \cdot 10^{18} \text{ Km}$

in pochi secondi

Vennero anche misurati i neutrini provenienti da SN1987 in diversi laboratori sotterranei: **Kamiokande, IMB, Baksan, LSD**

Oscillazioni del neutrino

Qual e' il valore di massa di un neutrino di "sapore" definito?

Attenzione:

- un neutrino di sapore definito **non ha un valore determinato di massa**
- una misura di massa puo' dare **uno di 3 possibili valori di massa**, ciascuno con una probabilita' definita
- queste proprieta' comportano il **fenomeno di trasformazione** del neutrino di un sapore in neutrino di diverso sapore (**oscillazione**)

Per esempio:

Passaggio dagli **stati con "sapore" definito** agli **stati con massa definita**

$$|\nu_e\rangle = a_1 |\nu_1\rangle + a_2 |\nu_2\rangle + a_3 |\nu_3\rangle$$

$|a_i|^2$ = **probabilita'** che lo stato $|\nu_e\rangle$ abbia massa m_i

Probabilita' totale = 1

$$|a_1|^2 + |a_2|^2 + |a_3|^2 = 1$$

Semplifichiamoci un po' la vita: consideriamo solo due "sapori"

nella sua evoluzione temporale il neutrino ν_e puo' trasformarsi in ν_μ

Probabilita' di trasformazione $\nu_e \longrightarrow \nu_\mu$

$$P \propto \sin^2 \left(1.27 \frac{\Delta m^2 L}{E} \right)$$

$$\Delta m^2 \equiv m_2^2 - m_1^2$$

E = energia in GeV
L = distanza in km
masse in eV/(c)²

$$P \propto \sin^2\left(1.27 \frac{\Delta m^2 L}{E}\right)$$

E = energia in GeV

L = distanza in km

masse in eV/(c)²

sensibilita' in $\Delta m^2 \equiv m_2^2 - m_1^2$

$$\Delta m^2 \approx \frac{E}{L}$$

neutrini solari

$$L \approx 10^8 \text{ km}, E = 0.2 - 15 \text{ MeV}$$

neutrini atmosferici

$$L \approx 20 - 10^4 \text{ km}, E = 0.1 - 100 \text{ GeV}$$

Neutrini atmosferici

raggi cosmici

Neutrini atmosferici: generati da interazioni di raggi cosmici con i nuclei dell'atmosfera con energia di 100 MeV - 100 GeV

Super-Kamiokande (Giappone)
MACRO (GS)

Masatoshi Koshiba
(Nobel 2002)

atmosfera terrestre: spessore 20 km
diametro terrestre: 13.000 km

Riassumendo, masse di neutrini:

Non esiste una determinazione dei valori assoluti delle masse.
Da misure di decadimenti beta e da considerazioni cosmologiche:

$$\text{massa del neutrino} < (0.1 - 1) \text{ eV}/c^2$$

**La prima comprensione
intuitiva della
oscillazioni del
neutrino e' dovuta a
Pontecorvo (1967)**

**Bruno Pontecorvo
(1913 – 1993)**

$$P \propto \sin^2\left(1.27 \frac{\Delta m^2 L}{E}\right)$$

E = energia in GeV

L = distanza in km

masse in eV/(c)²

sensibilita' in $\Delta m^2 \equiv m_2^2 - m_1^2$

$$\Delta m^2 \approx \frac{E}{L}$$

neutrini solari

$L \approx 10^8$ km, $E = 0.2 - 15$ MeV

neutrini atmosferici

$L \approx 20 - 10^4$ km, $E = 0.1 - 100$ GeV

neutrini da reattori nucleari

$E \approx 1$ MeV, L variabile

neutrini da acceleratori nucleari E variabile, L variabile

(Anti)-neutrini **da reattori nucleari** generati da
fissioni nucleari di U^{235} , U^{238} , Pu^{239} , Pu^{241}

Energia degli antineutrini circa 1 MeV

distanze variabili - negli esperimenti eseguiti o
in corso $L = 10 \text{ m}$, 1 km , 100 km

Neutrini da acceleratori

le misure di rivelazione devono essere fatte in ambienti
protetti dai raggi cosmici
(laboratori sotterranei - Laboratorio del Gran Sasso)

CNGS CERN to Gran Sasso Neutrino Project

$$\nu_{\mu} \longrightarrow \nu_{\tau}$$

Fascio di ν_{μ} prodotto al CERN e rivelato al LNGS dopo un viaggio di 731 km - tempo di percorrenza circa 2.4 millisecondi

massima profondita' circa 10 km
(raggio della terra circa 6400 km)

Esperimento OPERA al Gran Sasso

$$\nu_{\mu} \longrightarrow \nu_{\mu}$$

se avviene l'oscillazione:

$$\nu_{\mu} \longrightarrow \nu_{\tau}$$

Geoneutrini

(Anti)neutrini generati dalle catene di decadimento dei nuclei radioattivi U^{238} , Th^{232} , K^{40} nella terra

Questi decadimenti sono una delle maggiori fonti di calore generato dalla Terra

Quindi i geoneutrini sono anche di grande interesse geologico

I geoneutrini sono stati misurati in Giappone (KamLAND) e in Italia (Borexino, LNGS)

I neutrini come mezzo di **osservazione astronomica:**
astronomia neutrinica

direzione apparente del protone

I protoni di bassa energia possono raggiungere la Terra ma sono deflessi dai campi magnetici galattici e intergalattici

**I protoni ed i raggi gamma di alta energia vengono assorbiti dal fondo di
microonde**

**“acceleratore”
cosmico**

neutrini

detector

neutrino travels
through the earth

- infrequently, a cosmic neutrino crashes into an atom in the ice and produces a nuclear reaction

detector

muon

nuclear reaction

neutrino travels through the earth

Why 2 large detectors in 2

hemispheres?

Mediterranean
France 43° North
2/3 of time: Galactic Centre

AMANDA, IceCube
South Pole

TeV γ sources

Siti possibili

ANTARES, NEMO, NESTOR
deployment sites

Criteri di scelta:
bioluminescenza,
Intensita' correnti,
Trasparenza dell'acqua:

IceCube Neutrino Observatory

IceCube

70+ Strings with 60 optical modules
17 meters between optical modules
125 meters between strings
1 Giga Ton Detector

Air shower array

80 Pairs of Ice Cherenkov Tanks

Oggi ho fatto qualcosa di molto brutto,
proponendo **una particella che non puo'
essere rivelata**; e' qualcosa che un teorico
non dovrebbe mai fare

Wolfgang Pauli

Un'intuizione geniale seguita da un commento
fortunatamente errato !